

Нови видове от надсемейство Мусеторфилоидеа (Diptera) за фауната на България

Димитър Н. Бечев

3000 Враца, ул. Д. Бешовишки 10, вх. Г, ап. 33

Едно семейство (Diadocidiidae), седем рода (*Diadocidia*, *Neuratelia*, *Phthinia*, *Sciophila*, *Acnemia*, *Boletina*, *Phronia*) и 20 вида, включени в тази публикация, се съобщават за първи път за българската фауна. Някои от видовете са редки и известни само от едно или няколко находища в Европа. Тяхното установяване в България допринася за уточняване на географското им разпространение. Материалът е събран от Западна Стара планина и Западния Предбалкан. Данните за разпространението на видовете са взети главно от публикациите на Plassmann (1971) и Островерхова (1979).

Сем. BOLITOPHILIDAE

Bolitophila (B.) cinerea Meigen, 1818. Над Берковица, 800 m надм. в., 23. V. 1982 г., 1 ♂. Разпространение: Холарктика.

Сем. DIADOCIDIIDAE

Diadocidia (D.) ferruginosa (Meigen, 1830). X. Бялата вода (Козница), 770 m надм. в., 26. VI. 1982 г., 3 ♂; над Берковица, 700 m надм. в., 8. VII. 1982 г., 1 ♂, и 800 m надм. в., 23. V. 1982 г., 1 ♂. Разпространение: Холарктика.

Diadocidia (A.) valida Mik, 1874. X. Бялата вода (Козница), 770 m надм. в., 26. VI. 1982 г., 2 ♂. Рядък. Разпространение: Европа, Сибир и Азербайджан.

Сем. МУСЕТОРФИЛИДАЕ

Neompheria proxima (Winnertz, 1863). С. Осеновлаг (Софийски окръг), 6. VIII. 1983 г., 1 ♂. Рядък. Разпространение: Западна Германия.

Neuratelia minor (Lundström, 1912). X. Леденика (Врачанска планина), 800 m надм. в., 22. V. 1982 г., 7 ♂. Разпространение: Франция, Унгария, Румъния и Крим.

- *Phthinia humilis* Winnertz, 1863. Х. Бялата вода (Козница), 770 т надм. в., 10. VII. 1982 г., 1 ♂. Разпространение: Европа и Япония.
- *Sciophila baltica* Zaitzev, 1982. Веслец, 20. VII. 1982 г., 1 ♂; х. Бялата вода (Козница), 770 т надм. в., 26. VII. 1982 г., 1 ♀ и 6 ♂. Разпространение: Дания и Азербайджан.
- *S. hirta* Meigen, 1818. Х. Бялата вода (Козница), 770 т надм. в., 26. VII. 1982 г., 2 ♂. Разпространение: Холарктика.
- *S. lutea* Mascuart, 1826. Над Берковица, 700 т надм. в., 8. VII. 1982 г., 5 ♂; местн. Мътница (западно от Враца), 20. VI. 1982 г., 1 ♂. Разпространение: Европа, Алжир и Сибир.
- *S. nonnisilva* Hutson, 1979. Местн. Мътница (западно от Враца), 10. VII. 1982 г., 1 ♂. Разпространение: Канада, Англия и Азербайджан.
- *S. quadriterga* Hutson, 1979. С. Чирен (Врачански окръг), 10. V. 1982 г., 1 ♂; Веслец, 4. VI. 1982 г., 1 ♂. Разпространение: Англия и Европейската част на СССР.
- *Acnemia falcata* Zaitzev, 1982. Село Горна Бяла речка (Михайловградски окръг), 1. VIII. 1982 г., 1 ♂. Разпространение: Колски полуостров.
- *A. longipes* Winnertz, 1863. Веслец, 20. VII. 1982 г., 1 ♂; местн. Мътница (западно от Враца), 10. VII. 1982 г., 1 ♂. Разпространение: Европа, без южните части.
- *A. nitidicollis* (Meigen, 1818). Над Берковица, 800 т надм. в., 20. VIII. 1982 г., 1 ♂; х. Бялата вода (Козница), 770 т надм. в., 26. VI. 1982 г., 3 ♂; Веслец, 8. IV. 1983 г., 2 ♂. Разпространение: Европа и Сибир.
- *Boletina dispecta* Dziedziński, 1885. Х. Ком (Берковска планина), 1700 т надм. в., 25. VIII. 1981 г., 1 ♂. Разпространение: Европа, без южните части.
- *B. trivittata* (Meigen, 1818). Х. Пършевица (Врачанска планина), 1250 т надм. в., 20. V. 1982 г., 5 ♂, и 12. VI. 1982 г., 4 ♂; над Берковица, 800—1700 т надм. в., 25. VIII. 1982 г., 33 ♂ и 4 ♀. Разпространение: Европа и Япония.
- *Exechia peyerimhoffi* Burghelle - Balacesco, 1966. Под вр. Ком, 1600 т надм. в., 25. VIII. 1981 г., 1 ♂. Разпространение: Алжир, Франция и Швеция.
- *E. seriata* (Meigen, 1830). Под вр. Ком, 1200 т надм. в., 25. VIII. 1981 г., 1 ♂ и 1 ♀. Разпространение: Европа и Сибир.
- *Exechiopsis (E.) magnicauda* (Lundström, 1911). Берковица, 25. VIII. 1981 г., 1 ♂ и 1 ♀. Разпространение: Европа.
- *Phronia cinerascens* Winnertz, 1863. Под вр. Ком, 1200 т надм. в., 25. VIII. 1981 г., 1 ♂. Разпространение: Холарктика.

С това изследване броят на установените в България видове от надсемейство Мусетопилоида (без сем. Sciaridae, от което са съобщени само няколко вида) става 60.

