

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"  
 UNIVERSITE DE PLOVDIV "PAISSI HILENDARSKI"  
 Научни трудове, том 27, кн. 6, 1989 г. - Биология  
 TRAVAUX SCIENTIFIQUES, VOL. 27, FASC. 6, 1989-BIOLOGIE

НОВИ ВИДОВЕ МУСЕТОРНИЛОИДА (DIPTERA)  
 ЗА ФАУНАТА НА БЪЛГАРИЯ. III.

Д. Б е ч е в

При обработването на материали, събрани от автора в Западна и Централна Стара планина, бяха установени 40 нови за българската фауна вида от надсемейство Мусеторнилоида. Същевременно видът *GREENOMYIA MONGOLICA*, известен досега само от Амурска област, Монголия и Казахстан, се явява и нов за фауната на Европа.

Основните находища, от които е събран материалът, са: с. Дълги дел (Михайловградско), 650 м н.в.; северно под вр. Ком, 1700 м н.в.; х. Бялата вода (над гр. Вършец), 775 м н.в.; местн. Мътница (западно от Враца), 350 м н.в.; Враца, 350 м н.в.; Леденика (Врачанска планина), 800 м н.в.; хижа Пършевица (Врачанска планина), 1250 м н.в.; Веслец (северно от Враца), 550 м н.в.; с. Дивчовото (Тетевенско), 800 м н.в.; резервата Боатин, 900-1500 м н.в.

Сем. BOLITOPHILIDAE

*Bolitophila (Bolitophila) basicornis* (Mayer, 1915)

Материал: х. Бялата вода, 7. 10. 1983, 1 м екз.;  
 рез. Боатин, 06. 06. 1982, 1 м екз.

Разпространение: Европа, Сибир.

20. н. тр., 1989 - Биология

