

1990a

## НОВИ ВИДОВЕ МУСЕТОРФИЛОИДЕА (DIPTERA) ЗА ФАУНАТА НА БЪЛГАРИЯ. IV

Д. Бечев

Досега за фауната на България са съобщени 135 вида от надсемейство Musetorphiloidea. При обработването на материали, събрани от автора в Западна и Централна Стара планина, бяха установени още 30, неизвестни за страната ни вида.

**Сем. KEROPLATIDAE**

*Orfelia nigricornis* (Fabricius, 1805)

Изследван материал: Враца, 12.VI.1986.

Разпространение: Европа.

*Orfelia tristis* (Lundstroem, 1911)

Изследван материал: Враца, 12.VI.1986.

Разпространение: Холандия, Унгария, Румъния, България.

**Сем. MUSETOPHILIDAE**

*Neotempheria bimaculata* (von Roser, 1840)

Изследван материал: с. Караш (край гр. Роман), 2.VII.1988.

Разпространение: Европа.

*Megalopelma nigroclavatum* (Strobl, 1910)

Изследван материал: местн. Дъбника (край Враца), 20.VI.1990;

х. Пършевица (Врачанска планина), 17.VII.1983.

- Разпространение: Европа.
- *Anatella lenis* Dziedzicki, 1923  
Изследван материал: рез. Боатин, 20.IV.1983.  
Разпространение: Европа.
- *Anatella novata* Dziedzicki, 1923  
Изследван материал: северно под вр. Ком, 25.VIII.1981.  
Разпространение: Швеция, Германия, Чехословакия, България.
- *Anatella turi* Dziedzicki, 1923  
Изследван материал: рез. Боатин, 20.IV.1983.  
Разпространение: Европа.
- *Exechia dizona* Edwards, 1925  
Изследван материал: с. Кунино, 9.IV.1984.  
Разпространение: Европа, Сибир.
- *Exechiopsis (E.) clypeata* (Lundstroem, 1911)  
Изследван материал: рез. Боатин, 6.IV.1982.  
Разпространение: Европа.
- *Exechiopsis (E.) dimitrescui* (Burghel-Balacescu, 1972)  
Изследван материал: рез. Боатин, 6.IV.1983.  
Разпространение: Англия, Румъния, България, Монголия.
- *Rymosia placida* Winnertz, 1863  
Изследван материал: с. Дивчовото, 22.IV.1983; рез. Боатин, 20.IV.1983.  
Разпространение: Европа.
- *Rymosia setiger* Winnertz, 1863 *Dziedzicki, 1910*  
Изследван материал: с. Бързея, 1.VIII.1982.  
Разпространение: Европа.
- *Rymosia spinipes* Winnertz, 1863  
Изследван материал: местн. Леденика (Врачанска планина), 17.VII.1982;  
Веслец, 8.IV.1983; х. Бялата вода (над гр. Вършец), 10.VII.1982.  
Разпространение: Ср. и Ю. Европа, Афганистан.
- *Rymosia virens* Dziedzicki, 1910  
Изследван материал: рез. Боатин, 20.IV.1983.  
Разпространение: Европа.

